

**TRATTAMENTO ESTIVO 2018
PER IL CONTENIMENTO DELLA VARROA**

Inizio del trattamento: dal 15 luglio all' 1 agosto 2018.

Trattamento proposto: **APISTAN** (principio attivo fluvalinate) + **TIMOLI**

INIZIARE ENTRO L' 1 AGOSTO 2018

Sarà possibile scegliere il prodotto evaporante a base di Timolo tra due formulazioni presenti in commercio: 1) **APIGUARD : VASCLETTE** contenenti un gel impregnato di Timolo in grado di mantenere costante l'evaporazione al variare della temperatura (questo prodotto evaporante è consigliato dai tecnici del Consorzio); 2) **APILIFEVAR : TAVOLETTE** di spugna impregnate di Timolo, Eucaliptolo e Mentolo.

COSA SI DEVE FARE ?

PREPARATIVI comuni ad entrambe le modalità di trattamento:

- 1) **Togliere i melari - Obbligatorio**
- 2) Girare il coprifavo.
- 3) Mettere le griglie all'entrata dell'arnia.
- 4) Trattare contemporaneamente tutto l'apiario.
- 5) Inserire i trattamenti in ore serali.
- 6) Per massimizzare l'efficacia dei trattamenti è consigliata la somministrazione settimanale di piccole quantità di candito (1/4 di confezione) – **Facoltativo**

MODALITA' 1 : **APISTAN (strisce) + APIGUARD (vaschette)**

Materiale necessario: 2 strisce di Apistan e 2 vaschette di Apiguard per ogni famiglia su dieci telai.

Giorno1 **Inserire le due strisce di Apistan** in mezzo ai favi di covata, nella zona centrale dell'arnia. (Cioè fra 3°- 4° e fra 7°- 8° favo). **Inserire la prima vaschetta di Apiguard** sopra i favi aprendo completamente il coperchio di carta stagnola (si ricorda di girare il coprifavo).

Giorno 14 **Rimuovere la prima vaschetta di Apiguard ed inserire la seconda vaschetta** nella stessa posizione della prima, completamente aperta. Non togliere le strisce.

Giorno 28 **Rimuovere la seconda vaschetta di Apiguard.**
Non togliere le strisce.

Giorno 42 **controllare la caduta della varroa ed eventualmente lasciare le strisce fino alla decima settimana (70gg).** Si consiglia di aspettare qualche giorno, prima di aggiungere sulle famiglie eventuali melari.

MODALITA' 2 : APISTAN (strisce) + APILIFEVAR (tavolette)

Materiale necessario: 2 strisce di Apivar e 4 tavolette di Apilifevar (due confezioni) per ogni famiglia su dieci telai.

Giorno 1 Inserire le due strisce di Apivar in mezzo ai favi di covata, nella zona centrale dell'arnia (cioè fra 3°- 4° e fra 7°- 8° favo). **Inserire una tavoletta di Apilifevar spezzata in quattro parti**, sopra i favi, ai quattro angoli della camera di covata (si ricorda di girare il coprifavo). In caso di temperature elevate inserire il giorno prima un pezzetto di tavoletta per abituare la famiglia all'odore di timolo.

Giorno 7 Rimuovere i residui di tavoletta non portati via dalle api **ed inserire la seconda tavoletta con le stesse modalità della prima**. Non togliere le strisce.

Giorno 14 Inserire la terza tavoletta con le stesse modalità delle precedenti. Non togliere le strisce.

Giorno 21 Inserire la quarta tavoletta con le stesse modalità delle precedenti. Non togliere le strisce.

Giorno 28 Rimuovere i residui di tavoletta e Non togliere le strisce.

Giorno 42 controllare la caduta della varroa ed eventualmente lasciare le strisce fino alla decima settimana (giorno 70). Si consiglia di aspettare qualche giorno prima di aggiungere sulle famiglie eventuali melari.

TRATTAMENTO PER I NUCLEI

Per trattare nuclei fino a 5 favi coperti da api bisogna:**Dimezzare la quantità di prodotto utilizzato** (ad es. mezza tavoletta/vaschetta, una sola striscia) Rispettare **le stesse tempistiche** di intervento.

TRATTARE GLI ALVEARI E' FONDAMENTALE PER CONTENERE L'INFESTAZIONE DELLA VARROA NEL PROPRIO APIARIO E TUTELARE GLI APIARI VICINI DAL RISCHIO DI REINFESTAZIONE.

Qualora si scegliesse di non utilizzare i prodotti consigliati dal Consorzio, si invita a trattare i propri alveari **NELLO STESSO PERIODO** per ridurre la probabilità di reinfestazione.